Acta Phytotaxonomica Sinica

## 云南唇柱苣苔属一新种:

钱义咏

(云南省思茅行署林业局, 思茅市 665000)

## A NEW SPECIES OF CHIRITA (GESNERIACEAE) FROM YUNNAN, CHINA

Qian Yi-Yong

(Forestry Bureau, Simao Administrative Office, Simao, Yunnan 665000)

Key words Chirita; C. puerensis 关键词 唇柱苣苔属; 普洱唇柱苣苔

## 普洱唇柱苣苔 新种 图 1

Chirita puerensis Y. Y. Qian, sp. nov. (Sect. Chirita, Subsect. Chirita, Ser. Chirita)

Species affinis C. anachoretae Hance, sed foliorum laminis apice obtusis, bracteis ovatorotundis vel subreniformibus,  $1\sim1$ . 8 cm longis,  $1.2\sim2$ . 7 cm latis, calycis lobo postico uno deinde ad basin partito differt.

Herba annua. Caulis  $10\sim30$  cm longus,  $1\sim3$ -nodis, simplex, raro ramificans, glaber vel sparse puberulus. Folia basalia  $1\sim2$ , per anthesin putrida, raro non putrida, caulina opposita; laminae tenuiter herbaceae, ovatae vel ellipticae,  $1.7\sim14.5$  cm longae,  $1.2\sim7.5$  cm latae, apice obtusae, raro acutae vel breviter acuminatae, basi obliquae, rotundatae, subcordatae vel late cuneatae, margine serratae vel duplicato-serratae, supra inter nervos laterales dense vel sparse puberulae, subtus puberulae vel glabriusculae, nervis lateralibus  $4\sim8$ -jugatis, supra sparse puberulis, subtus dense vel sparse puberulis; petioli  $1.5\sim9.5$  cm longi, sparse puberuli. Cymae axillares,  $(2\sim)3\sim7$ -florae; bracteae ovato-rotundae vel subreniformes,  $1\sim1.8$  cm longae  $1.2\sim2.7$  cm latae, sparse ciliatae; pedunculi  $3\sim8$  cm longi, cum pedicellis glabri vel sparse puberuli; pedicelli  $0.4\sim1$  cm longi. Calyx albus,  $1.5\sim2$  cm longus, extra glaber, lobo postico uno deinde ad basin partito, delapso, lobis 4 ceteris triangularibus,  $4\sim7$  mm longis, apice corniculatis, cornibus recurvis sparse pilosis, haud ciliatis. Corolla alba, infundibularis,  $3.5\sim5$  cm longa, glabra, tubo  $2\sim3.3$  cm longo, ore  $1\sim1.3$  cm diam, intra postice superne 2-appendiculato (appendicibus stigma et antheras cingentibus), antice superne 2-luteo-maculato, labio postico  $5\sim9$  mm longo, labio antico  $10\sim14$  mm longo. Capsulae line-

<sup>\*</sup> 王文采教授赐给宝贵意见,作者敬致谢意。 1994-10-11 收稿。




图 1 普洱唇柱苣苔 1. 植株下部,示基生叶, 2. 植株上部,示花序; 3,4. 苞片; 5. 花萼, 6. 花萼展开; 7. 花萼顶端, 正面观; 8. 花萼顶端,侧面观; 9. 花冠; 10. 花冠展开; 11. 花盘及雌蕊; 12. 花盘及蒴果。

Fig. 1 Chirita puerensis 1. lower part of plant, showing basal leaf; 2. upper part of plant, showing inflorescence; 3,4. bracts; 5. calyx; 6. calyx opened up; 7. apex of calyx, front view; 8. apex of calyx, lateral view; 9. corolla; 10. corolla opened up; 11. disc and pistil; 12. disc and capsule.

ares, 8~12 cm longae. Semina 0.5~0.6 mm longa.

Yunnan(云南):Puer(普洱),Tongxin(同心),alt.1200~1400 m,in bushes on calcareous rocks,1992-08-28,Y.Y.Qian 2635 (holotype,PE; isotypes,IBK,SMAO) 1465,2330.

一年生草本。茎高  $10\sim30~\rm cm$ ,有  $1\sim3~\rm \ddot{t}$ ,不分枝,稀分枝,无毛或稀被微柔毛。基生叶  $1\sim2~\rm \ddot{t}$ ,在花期腐烂,稀不腐烂,茎生叶对生;叶片薄草质,卵形或椭圆形,长  $1.7\sim14.5~\rm cm$ ,宽  $1.2\sim7.5~\rm cm$ ,顶端钝,稀急尖或短渐尖,基部斜,圆形,浅心形或宽楔形,边缘具锯齿或重锯齿,上面在侧脉间密被或稀被微柔毛,下面侧脉间被微柔毛或近无毛;侧脉  $4\sim8~\rm M$ ,上面稀被微柔毛,下面密被或疏被微柔毛;叶柄长  $1.5\sim9.5~\rm cm$ ,稀被微柔毛。聚

伞花序腋生,有(2~)3~7朵花;苞片对生,卵圆形或近肾形,长 1~1.8 cm,宽 1.2~2.7 cm,有疏缘毛;花序梗长 3~8 cm,与花梗均无毛或稀被微柔毛;花梗长 0.4~1 cm。花萼白色,长 1.5~2 cm,外面无毛,上方 1 裂片裂至基部,易脱落,其余 4 裂片裂至 1/3~1/4,三角形,长 4~7 mm,顶端角状,角向外弯,稀被疏柔毛,无缘毛。花冠白色,漏斗形,长 3.5~5 cm,无毛;筒长 2~3.3 cm,口部直径 1~1.3 cm,内面后方上部具 2 附属物(在柱头和花药两侧包围着),前方上部具 2条黄斑,上唇长 5~9 mm,下唇长 10~14 mm。雄蕊 2,花丝着生于距花冠基部 14~18 mm 处,长 10~12 mm,中部变宽并稍膝状弯曲,上部稀被腺毛,花药长 2.9~3.2 mm,无毛。退化雄蕊 3 或 2,侧生者长 3.5~4.5 mm,被疏柔毛。花盘环状,高 0.3~0.5 mm。雌蕊长 2.5~3.5 cm,子房上部被微柔毛,花柱被微柔毛和腺毛,柱头长 3.5~3.7 mm,2 深裂。蒴果线形,长 8~12 cm,粗 1.5~2 mm,无毛。种子长 0.5~0.6 mm。

本种与光萼唇柱苣苔 C. anachorela Hance 相近,但叶片顶端钝,苞片卵圆形或近肾形,长  $1\sim1.8$  cm,宽  $1.2\sim2.7$  cm,花萼上方 1 裂片深裂至基部,易于区别。